

L'Associació Celiacs de Catalunya distribueix cartells en els centres de salut de Catalunya per potenciar el diagnòstic precoç de la malaltia celíaca

L'Associació Celiacs de Catalunya s'ha unit a la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) per llençar un projecte per potenciar i millorar el diagnòstic precoç de la malaltia celíaca a l'atenció primària, a través de la distribució de cartells als centres de salut

A Catalunya es tarda una mitjana de 7 anys en diagnosticar un pacient celíac adult

Barcelona, 20 d'abril de 2023. La malaltia celíaca (MC) és una patologia infradiagnosticada. S'estima que la prevalença d'aquesta malaltia a Europa és de l'1%. No obstant això, a Espanya un percentatge important de persones celíaques (75%) no saben que ho són. Aquest infradiagnòstic es deu, en moltes ocasions, a la simptomatologia atípica, mínima o fins i tot absent de la malaltia. Diagnosticar la MC de manera precoç és de gran importància per a evitar que l'evolució de la malaltia causi danys en l'organisme. La malaltia celíaca no tractada pot provocar cefalees, problemes de creixement, osteoporosi, infertilitat, mal hepàtic, neuropaties o càncer, més enllà de l'afectació a l'estómac.

L'Associació Celiacs de Catalunya s'ha unit a la Federació d'Associacions de Celiacs d'Espanya (FACE) per a crear estratègies que permetin millorar el diagnòstic precoç en l'atenció primària, desenvolupant eines que ampliïn el coneixement sobre aquesta malaltia. Amb aquest objectiu, **s'ha posat en marxa un projecte de distribució de material en els diferents centres de salut**, per a donar a conèixer la malaltia celíaca i l'existència de les associacions de celíacs. Es tracta d'un **cartell informatiu de “diagnòstic precoç”** en el qual s'assenyalen quins són els símptomes de la malaltia celíaca per edats. La MC es pot diagnosticar en qualsevol edat de la vida, afectant tant infants com als adults. Per això és important que amb aquesta informació qualsevol persona pugui identificar fàcilment si presenta algun d'aquests símptomes i ho consulti amb el seu metge.

L'Associació Celiacs de Catalunya farà arribar els cartells a centres hospitalaris, a metges especialitzats i als Centres d'Atenció Primària de Catalunya. Amb aquesta acció espera posar un gra de sorra més per aconseguir disminuir el temps que es tarda a diagnosticar els pacients celíacs, que actualment és d'una **mitjana de 7 anys en el cas d'adults a Catalunya.**

A més de la simptomatologia de la MC, en aquests cartells s'inclouen codis QR per a accedir fàcilment al manual “[Protocol per al diagnòstic precoç de la Malaltia Celíaca](#)”, per a professionals sanitaris, i també un altre manual amb informació per a pacients, familiars i cuidadors. En aquest document s'inclou informació sobre la malaltia celíaca, el seu diagnòstic, tractament i altres informacions d'utilitat com els contactes d'associacions de pacients o altres recursos d'Internet.

Sobre l'Associació Celiacs de Catalunya

L'[Associació Celiacs de Catalunya](#), entitat constituïda l'any 1977, som la primera organització creada a Espanya en defensa dels interessos de les persones celíaques i sensibles al gluten no celíaques.

Declarada **Entitat d'Utilitat Pública** l'any 1982, representem a les 541.000 persones (77.400 celíacs i 464.000 sensibles al gluten) que s'estima que hi ha a Catalunya i Menorca afectades per alguna patologia relacionada amb la ingesta de gluten, però també som l'organisme referent per als fabricants, distribuïdors, restauradors i empreses de servei del sector.

Des de la seva constitució l'any 2012, **som membres del Plenari del [Consell Consultiu de Pacients](#)**, òrgan assessor que representa les entitats de pacients davant de l'Administració catalana i que permet donar veu als pacients. A través d'aquest òrgan, les entitats adherides podem proposar aquelles iniciatives que considerem oportunes i també permet la participació en el procés d'elaboració de polítiques de salut.

Terminologia

Celíaquia: és una malaltia autoimmunitària crònica, de component genètic. No és una intolerància ni una al·lèrgia. Quan una persona celíaca ingereix gluten, s'atrofia l'intestí i afecta la capacitat d'absorbir els nutrients. A llarg termini, aquesta ingesta causa greus problemes de salut.

Sensibilitat al gluten no celíaca: coneguda popularment – i erròniament- com a “intolerància al gluten”, les persones sensibles al gluten no presenten els anticossos implicats en la celíaquia ni tampoc tenen una al·lèrgia al blat, però tenen simptomatologia en ingerir gluten, que millora en seguir la dieta sense gluten.

Al·lèrgia al blat: Es tracta d'una al·lèrgia. Pot provocar congestió nasal, nàusees, problemes respiratoris, inflamació de la boca o erupció amb picors, entre d'altres. Necessita tractament antihistamínic.

[Més informació](#) sobre la terminologia.

Per a més informació:

Irene Puig · irene@celiacscatalunya.org 670 34 96 82
Gemma Riera · gemma@celiacscatalunya.org 648 11 84 25